

Ficha Técnica

Tabic® IBVAR206

Vacuna contra Bronquitis Infecciosa, cepa variante 2 (origen IS/1494/06)

Descripción: Tabic® IBVAR206 es una vacuna viva, liofilizada, contra Bronquitis Infecciosa (BI) formulada con la cepa variante 2, atenuada de la cepa IS/1494/06 (GI-23) y propagada en embriones libres de patógenos específicos. Se presenta en forma de tabletas efervescentes, envasadas en un blíster de aluminio.

Indicaciones: Para la inmunización activa de pollos de engorde, reproductores y ponedoras sanas contra la Bronquitis Infecciosa y como ayuda en la reducción de la mortalidad, signos clínicos, lesiones y decomisos causados por la variante 2 y cepas relacionadas del virus de Bronquitis Infecciosa aviar. La vacuna puede ser administrada desde el primer día.

Métodos de administración: La vacuna Tabic IBVAR206 se puede administrar a través de aspersión en gota gruesa. Reconstituir la vacuna de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el prospecto localizado en la caja de cartón. Utilice siempre agua potable limpia, fría entre 6°C y 10°C y sin desinfectantes, con pH entre 5.5 y 7.5. Se recomienda usar un colorante azul para monitorear la aplicación. Para disolver la tableta, simplemente presione el blíster para depositarla en el agua. La tableta comenzará a disolverse inmediatamente y liberará gas en el proceso. Espere hasta que se logre una disolución completa y luego mezcle suavemente para asegurar una dispersión homogénea.

Administración en Aspersión

Aspersión en aves de un día: Rocíe a los pollitos de un día inmediatamente después de la eclosión o al llegar a la caseta de crianza, utilizando un sistema de aspersión con boquillas calibradas. Emplee un aspersor con boquilla que genere gotas entre 100 y 200 micras, asegurando la uniformidad en el tamaño de las gotas. Se recomienda realizar una prueba previa con agua para verificar el tiempo necesario para rociar el volumen recomendado para cada 1,000 aves.

Reconstituya 1,000 dosis de la vacuna en 200 a 250 mL de agua fría entre 6°C y 10°C, libre de cualquier desinfectante, con pH entre 5.5 y 7.5. Se recomienda agregar un colorante azul para monitorear la aplicación de la vacuna y asperje el volumen total en menos de 2 horas. Puede usarse un congelante en el contenedor de la vacuna para mantener la temperatura en el rango indicado.

Aspersión en aves mayores: Para aves de mayor edad, utilizar un aspersor equipado con una boquilla calibrada que genere gotas entre 100 y 200 micras, asegurando la uniformidad en el tamaño de las gotas. Reconstituir 1,000 dosis en 1 litro de agua fresca entre 6°C y 10°C, libre de cualquier desinfectante, con un pH entre 5.5 y 7.5. Adicione un colorante azul para monitorear la aspersión y administre toda la vacuna en un periodo menor a dos horas.

Como realizar una correcta aspersión: La aspersión se realiza a una distancia de 30 a 40 cm por encima de las aves. La aspersión de la vacuna debe avanzarse lentamente y a un ritmo constante procurando que las gotas caigan sobre las aves. Los sistemas de ventilación deben apagarse justo antes de iniciar la aspersión y encenderse inmediatamente después de concluir la vacunación.

Vacunar a horas tempranas de la mañana para evitar la evaporación de las gotas en condiciones calientes y secas. Para asperjar aves mayores, agrupe a las aves a un costado de la caseta para mejorar la calidad de la vacunación.

El tiempo máximo entre la preparación y el final de la aplicación de la vacuna no debe exceder 2 horas a temperatura ambiente.

Ficha Técnica

TAbic® IBVAR206

Bronquitis Infecciosa, cepa variante 2 (origen IS/1494/06)

Precauciones Generales

- Consulte a un Médico Veterinario acerca del programa de vacunación adecuado.
- Solo vacunar aves (parvadas) sanas.
- Asegúrese de vacunar a todas las aves de la parvada al mismo tiempo y que cada ave reciba una dosis completa.
- El pH del agua debe estar entre 5.5 y 7.5 y la temperatura del agua debe estar entre 6°C y 10°C.
- Agregue un colorante para monitorear la aplicación de la vacuna.
- Las vacunas vivas son susceptibles al sol, al calor, a los desinfectantes y a los detergentes y no deben exponerse a ellos.
- No sobredosificar ni usar dosis menores a las recomendadas.
- No utilice comprimidos de una sección perforada del blíster.
- No guarde ninguna parte de la solución con la vacuna no utilizada para usarse posteriormente.
- Las pastillas abiertas y/o reconstituidas deben utilizarse inmediatamente y en menos de dos horas después de su reconstitución.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenamiento

Almacenar de 2°C a 8°C, protegiendo a la vacuna del contacto con la luz.

Empaque

La vacuna se comercializa en blísteres de aluminio conteniendo 10 comprimidos de 1,000, 2,000, 3,000 o 5,000 dosis/comprimido. Es posible que no todas las presentaciones estén disponibles en todos los países.

Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del Médico Veterinario

Fabricado por: Abic Biological Laboratories Ltd.
West Industrial Zone, Beit Shemesh, Israel

Importado y Distribuido por:

GUC SRL

Av. 3er Anillo Interno – (C/Jesus Gomez) entre Av. Brasil y Virgen de Cotoca – Bolivia

SENASAG Reg. PUV N° 12505/24

Esta información ha sido preparada para profesionales técnicos de la industria.

Comuníquese con un Experto de Phibro | www.pahc.com

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

Technical Sheet

Information from Phibro Technical Services

TAbic® IBVAR206

Infectious bronchitis, strain variant 2 (origin IS/1494/06)

Description: TAbic® IBVAR206 is a live, freeze-dried vaccine against Infectious Bronchitis (IB) formulated with the variant 2, attenuated of the IS/1494/06 (GI-23) strain and propagated in SPF eggs. It comes in the form of effervescent tablets, packaged in an aluminum blister pack.

Indications: For the active immunization of healthy broilers, breeders and layers against Infectious Bronchitis and as an aid in the reduction of mortality, clinical signs, lesions and condemnations caused by variant 2 and related strains of the Avian Infectious Bronchitis virus. The vaccine can be administered at any age starting from day one.

Methods of administration: The TAbic IBVAR206 vaccine can be administered through coarse spray. Reconstitute the vaccine according to the instructions provided in the package leaflet located in the cardboard box. Always use clean, cool 6°C to 10°C, disinfectant-free, pH 5.5-7.5 water and add dye for vaccine application monitoring. To dissolve the tablet, simply press the blister pack to deposit the tablet in the water. The tablet will begin to dissolve immediately and release gas in the process. Wait until complete dissolution is achieved and then mix gently to ensure homogeneous dispersion of the vaccine.

Spray Management

Spraying day-old chicks (DOC): Spray DOC immediately post hatch or upon arrival at the breeding house, using a spray system with nozzles calibrated to generate droplets between 100 and 200 microns, ensuring uniformity in droplet size. It is recommended to pre-test with water to verify the time needed to spray the recommended volume per 1,000 birds. Reconstitute 1,000 doses of the vaccine in 200 to 250 mL of cool 6°C to 10°C, disinfectant-free, pH 5.5-7.5 water. Add blue dye for vaccine take monitoring, use ice packs to maintain low water temperature and spray the whole container in less than 2 hours.

Spraying on older birds: For older birds, use a sprayer equipped with a calibrated nozzle that generates droplets between 100 and 200 microns, ensuring uniformity in droplet size. Reconstitute 1,000 doses in 1 liter of cool 6°C to 10°C, disinfectant-free, pH 5.5-7.5 water. Add blue dye for vaccine take monitoring and spray the whole container in less than 2 hours.

Correct spray application: Spraying is done at 30 to 40 cm above the birds' heads. The spraying of the vaccine should be advanced slowly and at a constant pace, ensuring that the droplets fall on the birds. Ventilation systems should be turned off immediately before spray and turned on immediately after. Vaccinate early in the morning to prevent evaporation of droplets in hot, dry conditions. When spraying older birds on farm, crowd them to one side of the house to improve application quality. The maximum time between preparation and the end of vaccine application should not exceed 2 hours at room temperature. Reduce the stress of handling during vaccination.

Technical Sheet

Tabic® IBVAR206

*Infectious bronchitis, strain variant 2 (origin IS/1494/06)***General Precautions**

- Consult a veterinarian about the appropriate vaccination program.
- Only vaccinate healthy birds (flocks).
- Be sure to vaccinate all birds in the flock at the same time and that each bird receives a full dose.
- The pH of the water should be between 5.5 and 7.5 and the water temperature should be between 6°C and 10°C.
- Add blue dye for application and vaccine take monitoring.
- Live vaccines are susceptible to the sun, heat, disinfectants and detergents and should not be exposed to them.
- Do not overdose or under dose.
- Do not use tablets from a perforated section of the blister pack.
- Do not save any part of the unused vaccine solution for another day.
- Opened and/or reconstituted tablets should be used immediately and no longer than 2 hours.
- Keep out of reach of children and pets.

Storage

Store at 2°C to 8°C, protecting the vaccine from contact with light.

Packaging

The vaccine is marketed in aluminum blister packs containing 10 tablets of 1,000, 2,000, 3,000 or 5,000 doses/tablet. Not all presentations may be available in all countries.

Sale under prescription and application under the guidance of the veterinarian.

Manufactured by: Abic Biological Laboratories Ltd.
West Industrial Zone, Beit Shemesh, Israel

This information has been prepared for industry technical professionals.